

神河町新型コロナワクチンQ&A

◎満12歳から15歳の方の接種について

満12歳から15歳の方の接種券は、7月中旬頃発送予定です。12歳の方には、12歳の誕生日を過ぎてから発送します。学校等の接種で、早期に接種券が必要な場合は、神河町新型コロナワクチンコールセンター（32-1240）までご連絡ください。神河町での接種体制が整い次第、ホームページや防災行政無線でお知らせします。

◎被接種者が16歳未満の場合

接種日の時点で、被接種者が16歳に達していない場合は、予診票に保護者の署名が必要です。未成年であっても16歳以上の場合は、保護者の署名は必要ありません。

◎神河町外へ転出した場合

転出先の市町村へお問い合わせください。

◎大雨や台風などによる「警報発表」時の対応について

当日の午前10時時点で大雨、洪水、暴風のいずれかの警報が発表されている場合には、接種を中止します。中止する場合は、当日防災行政無線でお知らせします。その場合は後日、改めて振替接種日のご案内をさせていただきます。

◎職域接種について

勤務先等で接種を受けられる場合があります。その場合、勤務先等と住所地が異なる市町村であっても、お持ちの接種券を使用できます。詳細は勤務先等にご確認ください。

◎大規模接種会場について

兵庫県が設置している、次の大規模接種会場で接種する場合、住所地外接種の申請は不要で、お持ちの接種券で接種することができます。

接種会場	アクリエひめじ (姫路市文化コンベンションセンター)	西宮市立中央体育館
設置期間	6月21日～8月末(予定)	6月21日～9月末(予定)
開設時間	9:30～17:30	
申し込み方法	Webまたはハガキ ※変更になる可能性もあります	
ワクチンの種類	モデルナ製	

現時点での情報です。詳細な情報はホームページでご確認ください。



◇兵庫県新型コロナワクチン大規模接種 特設ページ

URL：<https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/daikibosessyu.html>

◇兵庫県ワクチン接種Web予約サイト

URL：<https://www.covid19-vaccine.mrso.jp/hyogo/VisitNumbers/visitnoAuth/>

二重予約にご注意ください！！

町外の医療機関や集団接種会場、大規模接種会場等で接種の予約をされた場合は、

不要になった予約を必ずキャンセルしてください。

キャンセルは神河町新型コロナワクチンコールセンター（32-1240）までお願いします。

新型コロナワクチンは貴重なワクチンですので必ずご連絡をお願いします。

ワクチン接種に関する問い合わせ先

ワクチン接種や予約に関する問い合わせ

神河町新型コロナワクチンコールセンター ☎32-1240 FAX 31-2800
平日：午前9時～午後5時まで

医学的な内容など専門的な相談

兵庫県新型コロナワクチン専門相談 ☎0570-006-733 FAX 078-361-1814
平日・土日祝：午前9時～午後5時30分まで




発症予防効果は **95%**

接種した人の発症率が、接種しなかった人の発症率より95%低いと報告されています。

- ☑重症化予防効果あり
- ☑高齢者への有効性も高い
- ☑人にうつす可能性を減らす効果が期待されている



十分な免疫



1回目を接種して2週間たってから効果が出始めます。
 2回目を接種して7日目以降から十分な免疫ができるとされています。



主な副反応

- 接種時の痛み
- 接種部位の腫れ
- だるさ
- 頭痛
- 筋肉痛
- 寒気
- 発熱
- 関節痛
- 吐き気

ほとんどは3日以内に回復

2回目の接種後は副反応が出る人が多いので、当日・翌日は予定をあけておくのがおすすめ!

- 解熱剤の使用OK

2日以上解熱しないとき
症状が重いとき



受診しましょう

接種当日の注意点

接種後は、体調の変化がないか確認するため、会場で待機をしていただきます

- 重いアレルギーなし→15分待機 (花粉症や喘息などの方は15分待機)
- 重いアレルギーあり→30分待機

アナフィラキシーとは?

ワクチン接種などの後、短時間(多くは30分以内)で以下の2つ以上の症状が出現すること

- 皮膚・粘膜症状(発疹、発赤、かゆみ)
- 消化器症状(腹痛、嘔吐)
- 循環器症状(血圧低下、意識障害)
- 呼吸器症状(呼吸が苦しい、ゼーゼーするなど)

アナフィラキシーは治療により回復し、後遺症は残りません

【帰宅後の過ごし方】

OK	ふだんの生活、入浴も可
NG	激しい運動、過度なアルコール摂取 接種部位を強く揉んだりこするなど

こんな人は接種できません



- ほかのワクチンを2週間以内に接種した
- 当日明らかな発熱(37.5℃以上)

過去にアナフィラキシーや重いアレルギー症状が出たことのある方は、集団での接種をお断りする場合があります。必ず事前に、主治医にワクチンを接種してよいかお尋ねください。

※ 次に当てはまる方は一般的には接種可能ですが、不安な場合は主治医にご相談ください。
アレルギー、花粉症、妊娠中、授乳中、薬を内服中、手術後、1回目の接種後に副反応が出た方